

COMMENT RÉALISER SON **AUTOTEST** NASAL ?



Les autotests sont destinés aux personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas des personnes contacts. Un formulaire est à remplir avant de procéder à l'autotest.

1 Se laver les mains, puis sortir les éléments de la boîte.



2



Retirer l'opercule du tube contenant la solution réactive et le placer à l'endroit prévu sur la boîte.

3 Sortir la cassette de son emballage, puis sortir l'écouvillon de son emballage.



4



Enfoncer doucement l'écouvillon verticalement sur 2 à 3 cm dans une narine.

5 Basculer l'écouvillon et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance.



6



Réaliser un mouvement de rotation.

7 Essorer l'écouvillon dans la solution pendant 10 secondes et mettre la tétine compte-gouttes sur le tube.



8



Déposer 4 gouttes de la solution dans le puit de la cassette. Patienter 10 à 15 minutes, avant de lire les résultats.

9

Si le résultat est **NÉGATIF**, retrouver le médiateur pour enregistrer votre résultat et récupérer votre certificat de test.

Si le résultat est **POSITIF**, s'isoler et effectuer immédiatement un test PCR de confirmation dans un laboratoire médical.

