

# Indicateurs de Prévention de Iatrogénie en EHPAD

- L'HAS a mis en place des indicateurs d'alerte et de maîtrise (AMI) de la iatrogénie pour les psychotropes et les médicaments cardiovasculaires chez la personne âgée. (indicateurs de 1 à 7)
- Les requêtes Assurance Maladie ont été réalisées sur les données de remboursements en ville pour les résidents **en EHPAD sans PUI.**
- Période : 3<sup>ème</sup> trimestre 2016

# Indicateurs de Prévention de l'atrogénie en EHPAD

## Résultats EHPAD sans PUI

Territoire : EURE

Résidents	Résidents Consommants	Taux Résidents Consommants	Taux REGIONAL Résidents Consommants
1621	1487	92%	87%

**INDICATEUR N°1 : Taux de résidents avec médicament de la démence (traitement Alzheimer) et une prescription de neuroleptiques**

Résidents Alzheimer	Résidents Alzheimer avec neuroleptiques	Taux Indicateur n°1	Taux REGIONAL Indicateur n°1
161	45	28,0%	26,4%

**INDICATEUR N°2 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 3 psychotropes ou plus délivré le même jour**

Résidents consommateurs	Résidents avec 3 psychotropes ou plus	Taux Indicateur n°2	Taux REGIONAL Indicateur n°2
1487	251	16,9%	15,2%

**INDICATEUR N°3 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de benzodiazépine à demie vie longue**

Résidents Consommants	Résidents avec benzodiazépine à demie vie longue	Taux Indicateur n°3	Taux REGIONAL Indicateur n°3
1487	119	8,0%	6,9%

**INDICATEUR N°4 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 2 diurétiques ou plus délivré le même jour**

Résidents Consommateurs	Résidents avec 2 diurétiques ou plus	Taux Indicateur n°4	Taux REGIONAL Indicateur n°4
1487	47	3,2%	3,4%

**INDICATEUR N°5 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 4 antihypertenseurs ou plus délivré le même jour**

Résidents Consommateurs	Résidents avec 4 antihypertenseurs ou plus	Taux Indicateur n°5	Taux REGIONAL Indicateur n°5
1487	50	3,4%	3,5%

**INDICATEUR N°6 : Taux de résidents avec prescription d'une association à risque majoré sans ionogramme sur 3 mois**

Association : « Diurétique de l'anse + diurétique thiazidique » ou « Diurétique antialdostérone + inhibiteur du SRA\*

Résidents avec association à risque majoré	Résidents avec association à risque majoré sans ionogramme sur 3 mois	Taux Indicateur n°6	Taux REGIONAL Indicateur n°6
118	35	29,7%	40,8%

**INDICATEUR N°7 : Taux de résidents sous AVK avec traitement antibiotique ou antifongique sans INR dans les 7 jours**

Résidents avec AVK et antibiotique ou antifongique	Résidents avec AVK et antibiotique ou antifongique sans INR sous 7 jours	Taux Indicateur n°7	Taux REGIONAL Indicateur n°7
54	20	37,0%	56,1%

\* SRA : Système Rénine Angiotensine

**INDICATEUR N°8** : Taux de prescription avec une prescription à risque d'insuffisance rénale aigue

Association	Résidents avec AINS	Résidents avec association	Taux Indicateur n°8	Taux REGIONAL Indicateur n°8
AINS + IEC	42	2	4,8%	4,7%
AINS + ARA II		0	0,0%	4,7%
AINS + Diurétiques		6	14,3%	10,8%
AINS + IEC + ARA II		0	0,0%	0,4%
AINS + IEC + Diurétiques		2	4,8%	2,5%
AINS + ARA II + Diurétiques		1	2,4%	2,2%
AINS + IEC + ARA II + Diurétiques		0	0,0%	0,0%

AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien

IEC : Inhibiteur de l' Enzyme de Conversion

ARA II : Antagoniste du système Rénine Angiotensine II