

Indicateurs de Prévention de Iatrogénie en EHPAD

- L'HAS a mis en place des indicateurs d'alerte et de maîtrise (AMI) de la iatrogénie pour les psychotropes et les médicaments cardiovasculaires chez la personne âgée. (indicateurs de 1 à 7)
- Les requêtes Assurance Maladie ont été réalisées sur les données de remboursements en ville pour les résidents **en EHPAD sans PUI**.
- Période : 3^{ème} trimestre 2016

Indicateurs de Prévention de l'atrogénie en EHPAD

Résultats EHPAD sans PUI

Territoire : LE HAVRE

Résidents	Résidents Consommants	Taux Résidents Consommants	Taux <i>REGIONAL</i> Résidents Consommants
1 495	1 435	96 %	87%

INDICATEUR N°1 : Taux de résidents avec médicament de la démence (traitement Alzheimer) et une prescription de neuroleptiques

Résidents Alzheimer	Résidents Alzheimer avec neuroleptiques	Taux Indicateur n°1	Taux REGIONAL Indicateur n°1
117	38	32,5 %	26,4%

INDICATEUR N°2 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 3 psychotropes ou plus délivré le même jour

Résidents consommateurs	Résidents avec 3 psychotropes ou plus	Taux Indicateur n°2	Taux REGIONAL Indicateur n°2
1 435	214	14,9 %	15,2%

INDICATEUR N°3 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de benzodiazépine à demie vie longue

Résidents Consommateurs	Résidents avec benzodiazépine à demie vie longue	Taux Indicateur n°3	Taux REGIONAL Indicateur n°3
1 435	80	5,6 %	6,9%

INDICATEUR N°4 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 2 diurétiques ou plus délivré le même jour

Résidents Consommants	Résidents avec 2 diurétiques ou plus	Taux Indicateur n°4	Taux REGIONAL Indicateur n°4
1 435	55	3,8 %	3,4%

INDICATEUR N°5 : Taux de résidents consommateurs avec prescription de 4 antihypertenseurs ou plus délivré le même jour

Résidents Consommants	Résidents avec 4 antihypertenseurs ou plus	Taux Indicateur n°5	Taux REGIONAL Indicateur n°5
1 435	43	3,0 %	3,5%

INDICATEUR N°6 : Taux de résidents avec prescription d'une association à risque majoré sans ionogramme sur 3 mois

Association : « Diurétique de l'anse + diurétique thiazidique » ou « Diurétique antialdostérone + inhibiteur du SRA*

Résidents avec association à risque majoré	Résidents avec association à risque majoré sans ionogramme sur 3 mois	Taux Indicateur n°6	Taux REGIONAL Indicateur n°6
127	44	34,6 %	40,8%

INDICATEUR N°7 : Taux de résidents sous AVK avec traitement antibiotique ou antifongique sans INR dans les 7 jours

Résidents avec AVK et antibiotique ou antifongique	Résidents avec AVK et antibiotique ou antifongique sans INR sous 7 jours	Taux Indicateur n°7	Taux REGIONAL Indicateur n°7
70	31	44,3 %	56,1%

* SRA : Système Rénine Angiotensine

INDICATEUR N°8 : Taux de prescription avec une prescription à risque d'insuffisance rénale aigue

Association	Résidents avec AINS	Résidents avec association	Taux Indicateur n°8	Taux REGIONAL Indicateur n°8
AINS + IEC	15	0	0, %	4,7%
AINS + ARA II		0	0,0 %	4,7%
AINS + Diurétiques		1	6,7 %	10,8%
AINS + IEC + ARA II		0	0 %	0,4%
AINS + IEC + Diurétiques		1	6,7 %	2,5%
AINS + ARA II + Diurétiques		1	6,7 %	2,2%
AINS + IEC + ARA II + Diurétiques		0	0 %	0%

AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien

IEC : Inhibiteur de l' Enzyme de Conversion

ARA II : Antagoniste du système Rénine Angiotensine II